



## PREPARO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA:

### LEIA COM ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para o seu bem-estar, siga as orientações abaixo:

- Não tomar aspirina ou medicações anticoagulantes (AAS, Clopidogrel, Warfarin, Marevan e outros) durante os 7 dias que antecedem o exame;
- Não é necessário jejum;
- Tomar um sachê de Traturil diluído em água, 3 horas antes do exame; Tomar um sachê de Traturil diluído em água, 24 horas depois do exame;
- Aplicar o Fleet-enema 3 horas antes do exame (siga as instruções da embalagem);
- Trazer um acompanhante;
- Chegar com 15 minutos de antecedência.

### CUIDADOS APÓS A BIÓPSIA:

- Nas primeiras horas após a biópsia, restrinja a atividade física, evitando grandes esforços e fazendo repouso relativo. Evite relação sexual durante três dias.
- Tomar bastante líquidos (evitar bebidas com gás). A alimentação é normal.
- Em caso de dor, tomar paracetamol (Tylenol) ou dipirona (Novalgina). Não tomar aspirina.
- Não dirigir imediatamente após o exame. Se for necessário viajar, de preferência com profissional de saúde acompanhando.
- Após o exame pode ocorrer febre baixa, algum sangramento retal (20% dos casos), urinário (50%) ou no sêmen (10%);
- **ATENÇÃO:** Procure uma emergência em caso de febre alta (38 graus Celsius) persistente, hemorragia com coágulos ou retenção de urina.

### **Clinica Radiológica Ltda.**

Rua Três de maio, 1045 | Pelotas/RS | 96010-620

Fone/whatsapp 53 32252233 | [contato@clinrad.com.br](mailto:contato@clinrad.com.br)

[www.clinrad.com.br](http://www.clinrad.com.br)